

### 3. おたふく

- 成人がかかると、卵巣炎・精巣炎・難聴などの合併症あり
- 妊娠早期にかかると流産のリスク
- 妊娠してからでは受けられません
- 受け方：ムンプスワクチンを生涯で2回接種

### 4. 百日咳

- 2カ月未満の赤ちゃんが百日咳にかかると、命にかかわります
- 原則として、妊娠している女性は受けられません(※)
- 妊娠を希望される女性、妊婦さんのご家族、生まれてくる赤ちゃんのおじいちゃん、おばあちゃんにおすすめ
- 受け方：DPTワクチンをこれまでの接種状況に応じて1~3回接種

※日本で認可されているワクチン(DPT=DTaP)は妊娠中の安全性が確立されていないため。医療機関によっては、妊娠中も受けられる海外のワクチン(TDaP)を採用しているところもあります。

妊娠をご予定されている女性には早めのワクチンをおすすめします！  
**麻疹・風疹・水痘・おたふくワクチンは接種後、2カ月の避妊が必要です**

## C. その他

屋外・さびた金属でケガをする可能性が高い方  
(建築現場・工場勤務の方など)

### 1. 破傷風

- 土や錆びた金属から感染
- 発症すると重度のけいれんを起こし、命に関わります
- 受け方：DPTワクチンをこれまでの接種状況に応じて1~3回接種

「今まで受けているか分からない…」、「自分は受けた方が良いのか分からない…」という方は、お気軽にご相談にいらしてください。お持ちの方は、ご自身の母子手帳や予防接種記録をご持参ください。

予防接種のご予約はお電話でも承ります。

鹿浜診療所 03 (3912) 8491

